


relato casos clínicos.



e.book *Cassio Kampits* e co-autores

Implante imediato na região anterior: aspectos cirúrgicos e protéticos

Sexo feminino, 37 anos, leucoderma

Paciente com fratura dos incisivos centrais (11,21) ocasionada por trauma automobilístico. Durante a anamnese e exame clínico a mesma relatou insatisfação estética pela ausência da papila interdental. No exame tomográfico observou-se presença de osso apical, assim como a tábua óssea vestibular. Foi realizado a exodontia dos elementos dentários, respeitando e mantendo a integridade dos tecidos moles. Imediatamente a exodontia realizamos a implantação imediata dos implantes **Biomorse XP**, preenchimento do “gap” enxerto ósseo bovino medular [**Bonefill Porous Médio**], enxerto de tecido conjuntivo na vestibular e a captura dos provisórios. Após o período de osseointegração completado realizou-se as moldagens de transferência com a adequada personalização dos transferentes. Sobre os implantes foi parafusado pilares personalizados em zircônia e cimentado coroas em E-max sobre os mesmos. O projeto reabilitador incluía o preparo dos incisivos laterais que posteriormente receberam laminados cerâmicos.





Cassio Kampits


Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.




Levantamento de seio maxilar pela técnica da janela lateral

Sexo feminino, 40 anos, leucoderma

Paciente procurou atendimento para realização de implantes na região do 16, no entanto a presença de um resto radicular e ausência de osso remanescente para a implantação fez com que a abordagem inicial fosse a realização de um levantamento de seio maxilar, assim como, preservar o tecido ósseo supracrestal. Inicialmente foi realizado a exodontia dental seguido da abertura de uma janela lateral e elevação do seio maxilar. Após a elevação, o seio maxilar foi preenchido com **Bonefill Porous Médio**, já a janela lateral, assim como, o espaço do resto radicular foi necessário a utilização de uma barreira de PTFE sobre o biomaterial, afim de impedir a migração de células indesejadas. Passado 6 meses foi possível a instalação do implante **Biomorse XP** e posterior confecção da prótese dentária.





Cassio Kalmpits


Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.



Open healing para a preservação de alvéolo pós-exodontia

Sexo masculino, 40 anos, leucoderma

Paciente com presença de lesão extensa na região do 16 e ausência de tecido ósseo apical. Foi planejado a exodontia, curetagem delicada da região, preservação do alvéolo utilizando uma lâmina de titânio intencionalmente exposta [**Surgitime Titânio Seal**] e "gap" preenchido com enxerto ósseo bovino medular [**Bonefill Porous Médio**]. Após 6 meses foi possível a instalação de implante **Biomorse XP** e posteriormente as etapas protéticas para a finalização da coroa sobre implante.











Cassio Kalmpits

Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.







Cassio Kalmpits


Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.




Aumento ósseo horizontal com malha de titânio

Sexo masculino, 40 anos

Paciente com deficiência óssea horizontal procurou tratamento para instalação de implantes nos incisivos centrais. Realizamos procedimento regenerativo horizontal utilizando matriz mineralizada bovina particulada [**Bonefill Porous Médio**] associada a malha de titânio com furos 0,15 mm [**Surgitime Titânio**] criando um arcabouço favorável para o enxerto. Após 11 meses foi instalado os implantes **Biomorse XP**.





caso clínico cortesia by
cassio.kampits | ana.kuentzer | cliciane.carvalho

Cassio Kampits


Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.




Aumento ósseo horizontal com malha de titânio

Sexo masculino, 46 anos

Paciente com deficiência óssea horizontal procurou tratamento para futura instalação de implantes. Dentre as opções de tratamento para a recuperação do tecido ósseo perdido, utilizamos uma matriz mineralizada bovina particulada [**Bonefill Porous Médio**] associada a malha de titânio com furos 0,15 mm [**Surgitime Titânio**] criando um arcabouço para “armazenar” o enxerto e permitir que a regeneração ocorresse sem a concorrência de tecido conjuntivo.





caso clínico cortesia by
cassio.kampits | luciano.pratto | diego.pons | haron.presser | nathanael.perius

Cassio Kampits


Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.



Implante com estética imediata em região anterior da maxila

Sexo masculino, 18 anos

Paciente foi encaminhado para avaliação clínica dos incisivos centrais. Ambos apresentavam reabsorção externa, inicialmente foi conduzido um procedimento de manutenção do rebordo alveolar utilizando uma matriz mineralizada bovina particulada [**Bonefill Porous Médio**] e membrana de pericárdio bovina [**Surgitime Collagen**] minimizando a reabsorção do rebordo residual e, portanto, permitindo a futura instalação de implantes que satisfazem os critérios estéticos e funcionais.





caso clínico cortesia by

cassio.kampits | luciano.pratto | haron.presser | carolina.rifel | marcos.balvedi

Cassio Kampits

Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.



Implante imediato na região anterior

Sexo feminino, 25 anos

O tratamento proposto foi exodontia, implante imediato e provisório no mesmo ato da cirurgia. Exodontia feita com cuidado preservando a crista alveolar, fresagem para instalação do implante cone morse [**Biomorse XP**] utilizando um pilar universal para a confecção do provisório e posteriormente pilar personalizado em zircônia para a prótese definitiva. Foi utilizado material de preenchimento entre a tábua óssea e o implante.





caso clínico cortesia by
cassio.kampits

Cassio Kampits


Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.




Selamento alveolar com cicatrizador personalizado após colocação imediata do implante

Sexo masculino, 30 anos

Paciente apresentava perfuração radicular. O plano de tratamento incluiu a indicação de exodontia, seguida de um implante imediato cone morse [**Biomorse XP**] associado a um cicatrizador personalizado [feito no pilar de titânio] para manter a caracterização do contorno gengival do elemento e um pilar universal para a prótese definitiva. Foi utilizado uma matriz mineralizada bovina particulada [**Bonefill Mix**] para preenchimento entre a tábua óssea e o implante.





caso clínico cortesia by

cassio.kampits | luciano.pratto | haron.presser | diogo.pons | artur.klein

Cassio Kampits


Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.




Open healing para a preservação de alvéolo pós-exodontia

Sexo feminino, 29 anos

O plano de tratamento incluiu a implantação imediata [**Biomorse XP**] na região posterior com defeitos ósseos utilizando matriz mineralizada bovina particulada [**Bonefill Mix**] e lâmina de titânio [**Surgitime Titânio Seal**]. Após 3 meses de osseointegração, manipulamos os tecidos moles com o pilar provisório sobre implante. Terminado a manipulação tecidual foi realizado uma transferência personalizada. Caso finalizado com pilar personalizado.





caso clínico cortesia by

cassio.kampits | luciano.pratto | haron.presser | sabrina.cairus | andressa.trizotto

Cassio Kampits


Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.



Open healing para a preservação de alvéolo pós-exodontia

Sexo masculino, 50 anos

Dentre as opções de tratamentos, optamos pela instalação de implantes cone morse imediatos [**Bio-morse XP**] na região posterior mandibular seguido de preenchimento do alvéolo com matriz mineralizada bovina particulada [**Bonefill Mix**] e lâmina de titânio [**Surgitime Titânio Seal**]. Após a osseointegração realizou-se os provisórios sobre implante para o correto condicionamento tecidual.





caso clínico cortesia by

cassio.kampits | luciano.pratto | haron.presser | carlos.scherer | samuel.maximovitz

Cassio Kampits


Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.




Aumento ósseo horizontal com malha de titânio

Sexo masculino, 47 anos

Paciente com deficiência óssea horizontal. O tratamento proposto para regeneração óssea foi a utilização de matriz mineralizada bovina particulada [**Bonefill Porous Médio**] associada a malha de titânio com furos 0,15 mm [**Surgitime Titânio**] para a manutenção do enxerto em posição e posterior instalação de implantes cone morse [**Biomorse XP**].





caso clínico cortesia by

cassio.kampits | luciano.pratto | haron.presser | carlos.scherer | samuel.maximovitz

Cassio Kampits


Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.



Open healing para a preservação de alvéolo pós-exodontia

Sexo masculino, 50 anos

Paciente procurou tratamento para implantação no dente 46. O plano de tratamento proposto foi preservação alveolar pós extração com a instalação de implantes imediatos [**Biomorse XP**] utilizando uma matriz mineralizada bovina particulada [**Bonefill Porous Médio**] para preenchimento do gap e lâmina de titânio [**Surgitime Titânio Seal**] intencionalmente exposta em meio bucal para fechamento do alvéolo.





caso clínico cortesia by

cassio.kampits | luciano.pratto | haron.presser | carlos.scherer | samuel.maximovitz

Cassio Kampits

Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.



Implante com estética imediata em região anterior da maxila

Sexo feminino, 46 anos

Paciente insatisfeita com a estética anterior, durante exame radiográfico percebeu-se uma fratura dental no elemento 11. O tratamento proposto foi exodontia, instalação de implante imediato [**Bio-morse EZ**] com coroa provisória e preenchimento entre a tábua óssea e o implante. Posteriormente reabilitação dos elementos 13 ao 23.





caso clínico cortesia by

cassio.kampits | **luciano.pratto** | **haron.presser** | **carlos.scherer** | **samuel.maximovitz** |
marina.barbosa

Cassio Kampits

Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela **Bionnovation Biomedical**. Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do dentista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e do(s) autor(es) em causa.

